

KRŪTIES PIKTYBINIO NAVIKO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklis	Rodiklio aprašymas	Siektina rodiklio reikšmė	Duomenų teikėjas
1.	Bent kartą per Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos (toliau – Programa) ciklą ištirtos moterys			
	Moterų, kurioms pagal Programą bent kartą atliktas mamografinis tyrimas, dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą bent kartą atliktas mamografinis tyrimas, dalis nuo visų 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) $\frac{45-74 \text{ metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms bent kartą per 2 metų Programos ciklą atliktas mamografijos tyrimas, skaičius} \times 100}{45-74 \text{ metų (imtinai) amžiaus moterų skaičius}}$	Ne mažiau kaip 70 proc.	Koordinavimo centras (toliau – KC)
2.	Moterų kvietimo dalyvauti Programoje aprėptis			
	Pakviestų dalyvauti Programoje tikslinės populiacijos moterų dalis	Per 2 metų Programos ciklą dalyvauti Programoje pakviestų 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų dalis nuo visų Programos tikslinės populiacijos moterų (proc.) $\frac{\text{Per 2 metų Programos ciklą į Programą pakviestų 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų skaičius} \times 100}{45-74 \text{ metų (imtinai) amžiaus moterų skaičius}}$	100 proc.	KC
3.	Moterų atsiliepimo į kvietimą dalyvauti Programoje aprėptis			
	Dalyvauti Programoje pakviestų moterų, kurioms pagal Programą atliktas mamografinis tyrimas, dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurios per 2 metų Programos ciklą buvo pakviestos dalyvauti Programoje ir kurioms pagal Programą atliktas mamografinis tyrimas, dalis nuo visų 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurios per 2 metų Programos ciklą buvo pakviestos dalyvauti Programoje (proc.) $\frac{45-74 \text{ metų (imtinai) amžiaus moterų, kurios per 2 metų Programos ciklą buvo pakviestos dalyvauti Programoje ir kurioms pagal Programą atliktas mamografinis tyrimas, skaičius} \times 100}{45-74 \text{ metų (imtinai) amžiaus moterų, kurios per 2 metų Programos ciklą pakviestos dalyvauti Programoje, skaičius}}$	Ne mažiau kaip 70 proc.	KC

4.	Pagal Programą atliktų mamografinių tyrimų aprėptis			
	Pagal Programą atliktų mamografinių tyrimų dalis	Per 2 metų Programos ciklą 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterims atliktų mamografinių tyrimų dalis nuo visų per tą patį laikotarpį Programoje dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) $\frac{\text{Per 2 metų Programos ciklą 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterims atliktų mamografinių tyrimų skaičius} \times 100}{\text{Per tą patį laikotarpį Programoje dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų skaičius}}$	Nenus- tatoma	KC
5.	Krūties piktybinio naviko (C50) nustatymo dažnis			
	Moterų, kurioms Programos vykdymo metu nustatytas krūties piktybinis navikas (C50), dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą patvirtintas krūties piktybinis navikas (C50), dalis nuo per 2 metų Programos ciklą ištirtų (atliktas mamografinis tyrimas) 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų skaičiaus (proc.) $\frac{\text{Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms patvirtintas krūties piktybinis navikas (C50), skaičius} \times 100}{\text{Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų skaičius}}$	Nenus- tatoma	KC
6.	Neinvazyvus (carcinoma in situ, D05) krūties piktybinio naviko nustatymo Programos vykdymo metu dažnis			
	Moterų, kurioms Programos vykdymo metu nustatytas neinvazyvus krūties piktybinis navikas, dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą nustatytas neinvazyvus krūties piktybinis navikas, dalis nuo per 2 metų Programos ciklą ištirtų (atliktas mamografinis tyrimas) 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) $\frac{\text{Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms nustatytas neinvazyvus krūties piktybinis navikas, skaičius} \times 100}{\text{Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms atliktas mamografinis tyrimas, skaičius}}$	Nenus- tatoma	KC
7.	Krūties piktybinio naviko, kurio dydis ≤ 10 mm, nustatymo Programos vykdymo metu dažnis			
	Moterų, kurioms Programos	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis ≤ 10 mm, dalis	Nenus- tatoma	KC

	vykdymo metu nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis ≤ 10 mm, dalis	nuo per 2 metų Programos ciklą ištirtų (atliktas mamografinis tyrimas) 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis ≤ 10 mm, skaičius x 100 Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms atliktas mamografinis tyrimas, skaičius		
8.	Krūties piktybinio naviko, kurio dydis > 20 mm, nustatymo Programos vykdymo metu dažnis			
	Moterų, kurioms Programos vykdymo metu nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis > 20 mm, dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis > 20 mm, dalis nuo per 2 metų Programos ciklą ištirtų (atliktas mamografinis tyrimas) 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms nustatytas krūties piktybinis navikas, kurio dydis > 20 mm, skaičius x 100 Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms atliktas mamografinis tyrimas, skaičius	Nenus-tatoma	KC
9.	Krūties piktybinio naviko be limfmazgių pažeidimo nustatymo Programos vykdymo metu dažnis			
	Moterų, kurioms Programos vykdymo metu nustatytas krūties piktybinis navikas be limfmazgių pažeidimo, dalis	45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms per 2 metų Programos ciklą nustatytas krūties piktybinis navikas be limfmazgių pažeidimo, dalis nuo per 2 metų Programos ciklą ištirtų (atliktas mamografinis tyrimas) 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų (proc.) Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms nustatytas krūties piktybinis navikas be limfmazgių pažeidimo, skaičius x 100 Programoje per 2 metų Programos ciklą dalyvavusių 45–74 metų (imtinai) amžiaus moterų, kurioms atliktas mamografinis tyrimas, skaičius	Nenus-tatoma	KC

Pastabos:

1. Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos efektyvumo vertinimo rodikliai parengti atsižvelgiant į Atrankinės patikros dėl krūties vėžio ir diagnostikos kokybės užtikrinimo Europos gaires (Perry N, Broeders M, de Wolf C, Törnberg S, Holland R, et. al. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth Edition 2006; Muratov S,

Canelo-Aybar C, Tarride JE, Alonso-Coello P, Dimitrova N, et. al. Monitoring and evaluation of breast cancer screening programmes: selecting candidate performance indicators 2020).

2. Koordinavimo centrai prireikus dėl rodikliams apskaičiuoti reikalingos informacijos kreipiasi į Higienos institutą, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitas valstybės institucijas.
